

日帰り 緑内障 手術

目的

- ①眼圧を下げる
- ②緑内障の目薬を減らす
- ③緑内障発作※1の予防

【手術時間】
5分～40分
(局所麻酔)



※1 緑内障発作について

緑内障発作は、隅角がふさがって房水が溜まる事で急激に眼圧が上がります。放置すると、ごく短時間で失明に至ることもあります。


〈症状〉

激しい眼痛、頭痛、
視力低下、充血



房水の 流れ

房水は毛様体で作られ瞳孔を通り、隅角にある線維柱帯で濾過され、シュレム管という管を通して、目の外へ排出されます。房水の流れを良くし眼圧を下げるのが治療になります。



房水の 排出経路	隅角		線維柱帯・シュレム管		目の外へ排出
流れない 原因	閉塞隅角 隅角が狭くて、房水が流れない 		開放隅角 隅角は広いが、線維柱帯・シュレム管が目詰まりしている 		
手術方法	レンゼクトミー (白内障手術) 白内障になると、水晶体が厚くなり虹彩を押し上げるため隅角が狭くなります。手術で薄い眼内レンズに交換し隅角を広げます。 		ロトミー 目詰まりしている線維柱帯を切開します。 		レクトミー 本来とは別に房水の流出路を作り房水を外に排出させます。
	<p>当院で最も多い手術です。</p>				<p>ステンレス製のチューブを前房へ挿入する方法もあります。(エキスプレス)</p>
	<p>眼の形状によっては、白内障も軽度、視力も良好!!にも関わらず、レンゼクトミー(白内障手術)をお勧めすることがあります。病状によっては、同時にロトミー手術を行うことがあります。</p>				

